

Kidurrant a H1N1 lufija

2009 december 15. Flag

Szöveg méret

90
Mentés

- 0

Értékelés kiválasztása


Még nincs értékelve

Mérték


Semmivel sem t?nik veszélyesebbnek szezonális rokonánál az új típusú influenza, s?t: a bizonyítottan H1N1-fert?zés okozta halálesetek száma éves és globális szinten nagyságrendekkel kisebb, mint a „hagyományos” vírus esetében – derült ki a a WHO magyarországi irodájának tájékoztatásából.

A Harvard egyetem munkatársai még a WHO-énál is biztatóbb adatokat közöltek az új típusú influenzafert?zéssel kapcsolatban: felmérésük szerint – melyet Milwaukee és New York városok adatbázisai alapján hoztak létre – kétezer H1N1-fert?zött közül csak egy hal meg, s a betegség mortalitási aránya 0,048 ezrelék körül járhat.

Sajtóértesülések szerint 2009. december 12-én, azaz szombaton 26-ra emelkedett a H1N1 hazai áldozatainak száma, és 20 ezernél is több ember fert?z?dött meg a betegség Magyarországra érkezése óta; a járvány tehát valós veszélyt jelenthet – kérdéses viszont, hogy szükséges-e nagyobb jelent?séget tulajdonítani neki, mint a szezonális influenzának.



A két betegségtípus összehasonlításához el?ször az ÁNTSZ segítségét kértük, ám az intézet sajtóosztályán közölték: idén csak az új típusú influenza terjedésével foglalkoztak, a szezonális típus morbiditási/mortalitási arányairól nincs adatuk. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szintén nem foglalkozott érdemben a kérdéssel: mint közölték, utoljára 2004-ben (!) vizsgálták a szezonális vírus halálozási rátáját – akkor 5-en vesztették életüket a betegség következtében, 2003-ban viszont 23 személy hunyt el ilyen jelleg? fert?zés miatt. A valós számok meghatározását az is nehezíti, hogy az influenzafert?zés a legtöbb esetben szöv?dményként és nem els?dleges halálozási okként jelenik meg – például tüd?gyulladáshoz vezet – így a statisztikákban nem is mindig látható, mondta el szerkeszt?ségünknek a KSH megkérdezett szakért?je, Branyiczkiné Géczi Gabriella. Ráadásul, betegségek megkülönböztetésére használt négyjegy? BNO-kód alapján nem is derül ki, hogy adott esetben a H1N1-fert?zésr?l van e- szó. Bár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy új kódot hozott létre a betegség jelölésére, az csak 2009-t?l érvényes, korábbi esetekre nem vonatkozik. Branyiczkiné úgy tudja, hogy a KSH utoljára 2008-ban készített statisztikát az influenzás megbetegedésekkel és halálozásokkal kapcsolatban, ez azonban egységesített elemzés, ami minden ismert esetet és fert?zéstípust megjelenít – összehasonlítási alapot tehát nem nyújthat.



A témában megkerestük a WHO magyarországi képviseletét is: Horváth Linda sajtóreferens els? alkalommal nem tudott pontos adatot közölni a szezonális influenza mortalitási szintjér?l – mint mondta, évente világszerte 250 ezer és 500 ezer közé tehet? járvány halálos áldozatainak száma, ám inkább a valós mennyiség többnyire inkább a fels? érték felé közelít. A közvetlenül a H1N1-hez köthet? halálozások száma viszont ennél jóval kevesebb: a világszervezet honlapján közzétett adatok szerint a járvány 2009 áprilisa óta 207 országban ütötte fel fejét és legkevesebb 8768 esetben bizonyult végzetesnek. Horváth kés?bb közleményben tájékoztatta szerkeszt?ségünket: e szerint az új influenza halálozási aránya egyel?re kisebb, mint a szezonális influenzáé. „a szezonális influenzának hozzávet?legesen 0,1% a halálozási rátája, míg az új influenzának, a jelenlegi adatok alapján, 0,05-0,07 százalék lehet.” -derül ki a levélb?l, mely egyúttal figyelmeztet, hogy a járványnak még nincs vége, s id?vel a f?leg becsléseken alapuló mortalitási adatok is változhatnak. Az új influenza veszélyét is az jelzi – írja Horváth –, hogy szezonális rokonánál fert?z?bbnek bizonyult (f?leg az egészséges fiatal feln?ttek, gyermekek, kismamák esetében) és nagyon gyorsan vezethet súlyos tüd?gyulladáshoz.



A Harvard egyetem munkatársai még a WHO-énál is biztatóbb adatokat közöltek az új típusú influenzafert?zéssel kapcsolatban: felmérésük szerint – melyet Milwaukee és New York városok adatbázisai alapján hoztak létre – kétezer H1N1-fert?zött közül csak egy hal meg, s a betegség mortalitási aránya 0,048 ezrelék körül járhat. Másfel?l, amerikai statisztika jóval több betegr?l és elhunytról tud, mint amennyir?l honlapján az Egészségügyi Világszervezet beszámolt. Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) legújabb jelentése alapján csak az Egyesült Államokban 50 millióan kapták el a fert?zést, a halálos áldozatok száma pedig csak itt 10 ezer körül lehet – igaz, a szezonális influenzafert?zés évente átlagosan 36 ezer életet követel.

Koncz Tamás
OrientPress Hírügynökség



Ajánló